Versuche zum Eisenthiocyanat-Gleichgewicht

Geräte:

2 Bechergläser, 6 Reagenzgläser, Spatel, Dreifuß mit Asbestdrahtnetz, Brenner.

Chemikalien:

Eisen III-Chlorid FeCl_3 , Ammoniumthiocyanat NH_4SCN , Ammoniumchlorid NH_4Cl , Eiswürfel

Herstellung der Stammlösung:

1,6 g FeCl_3 und 2,3 g NH_4SCN werden in je 200 ml Wasser gelöst. Beide Lösungen werden vereinigt. Dann wird soweit mit Wasser verdünnt, bis die Lösung **hellrot** erscheint.

Durchführung:

6 Rg werden zur Hälfte mit der Stammlösung gefüllt.

Rg 1: Vergleichslösung

Rg 2: Zugabe einer Spatelspitze FeCl_3

Rg 3: Zugabe einer Spatelspitze NH_4SCN

Rg 4: Zugabe einer Spatelspitze NH_4Cl

Rg 5: Abkühlen der Stammlösung in Eiswasser

Rg 6: Erwärmen der Stammlösung im heißen Wasserbad

Aufgaben:

Bei der Herstellung der Stammlösung bildet sich rotes Eisentriothiocyanat:

In Konkurrenz dazu bildet sich der weniger stabile orange Ammoniumhexachloroferrat-III:

zu Rg2 - 4: Geben Sie jeweils an, welche Konzentrationen geändert werden und wie sie die Lage der beiden Gleichgewichte beeinflussen.

zu Rg5 - 6: Geben Sie jeweils an, in welche Richtung das Gleichgewicht durch Erhöhung bzw. Herabsetzung der Temperatur verschoben wird. Ist die Hinreaktion exotherm oder endotherm?