

## 5.5. Aufgaben zur Integralrechnung

### Aufgabe 1: Stammfunktionen

Bestimmen Sie jeweils alle Stammfunktionen für die folgenden Funktionen:

- |                              |                    |   |   |
|------------------------------|--------------------|---|---|
| a) $f(x) = 0$                | f) $f(x) = x^2$    | k) $f(x) = x^n$ mit $n \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ | p) $f(x) = 16x^4 + x - 7 + \frac{5}{x^2} - \frac{30}{x^3}$  |
| b) $f(x) = 1$                | g) $f(x) = x^3$    | l) $f(x) = 5x^2 - 3x + 6$                               | q) $f(t) = \frac{3}{2}t - \frac{1}{2\sqrt{t}}$              |
| c) $f(x) = 2$                | h) $f(x) = x^{-3}$ | m) $f(x) = x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$                     | r) $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ |
| d) $f(x) = a \in \mathbb{R}$ | i) $f(x) = x^{-2}$ | n) $f(u) = 4u^3 - 3u^2 + 7u$                            | s) $f(t) = \sin t$  |
| e) $f(x) = x$                | j) $f(x) = x^{-1}$ | o) $f(x) = \frac{3}{2}x^2 - 3x + \sqrt{x} - 5$          | t) $f(t) = \cos t$  |

### Aufgabe 2: Hauptsatz und Eigenschaften des Integrals

Berechnen Sie die folgenden Integrale:

- |  |   |
|--|---|
| a) $\int_{-1}^1 (-\frac{1}{2}x^2 - x + \frac{3}{2})dx$ | d) $\int_1^2 x^2 dx$ , $\int_2^3 x^2 dx$ und $\int_1^3 x^2 dx$ (Intervalladditivität) |
| b) $\int_{-1}^2 (x^3 + x^2)dx$                         | e) $\int_2^1 x^2 dx$ (Vertauschung der Grenzen bzw. $dx < 0$ )                        |
| c) $\int_{-3}^{-2} (x^2 + 3x + 2)dx$                   | f) $\int_0^3 (x^2 - 4x + 3)dx$ (Flächen unterhalb der x-Achse bzw. $f(x) < 0$ )       |

### Aufgabe 3: Flächen unterhalb der x-Achse

Berechnen Sie den Gesamtinhalt F aller Flächen, die von den Senkrechten  $x = a$  bzw.  $x = b$  sowie von der x-Achse und dem Schaubild von f begrenzt werden:

- |   |   |
|---|---|
| a) $f(x) = x^2 - 1$ mit $a = -1$ und $b = 2$        | d) $f(x) = x^3 - x$ mit $a = -1$ und $b = 1$    |
| b) $f(x) = -x^2 - 4x - 3$ mit $a = -4$ und $b = -1$ | e) $f(x) = x^3 - x$ mit $a = -1$ und $b = 2$    |
| c) $f(x) = x^3$ mit $a = -1$ und $b = 2$            | f) $f(t) = \sin t$ mit $a = -\pi$ und $b = \pi$ |

### Aufgabe 4: Flächen unterhalb der x-Achse

Berechnen Sie den Gesamtinhalt der Flächen, die durch das Schaubild von f und die x-Achse eingeschlossen werden.

- |                      |                      |                        |                             |
|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| a) $f(x) = -x^2 + 1$ | b) $f(x) = x^3 - 4x$ | c) $f(x) = -x^4 + x^2$ | d) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ |
|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|

### Aufgabe 5: Flächen zwischen zwei Schaubildern

Berechnen Sie den Gesamtinhalt A aller Flächen, die durch die Schaubilder der Funktionen f und g sowie die Senkrechten  $x = a$  und  $x = b$  eingeschlossenen werden.

- |   |   |
|---|---|
| a) $f(x) = -x^2 + 2$ , $g(x) = -x^2 + 3$ , $a = -1$ und $b = 1$ | d) $f(x) = x^2$ , $g(x) = x$ , $a = 0$ und $b = 2$                                |
| b) $f(x) = x^2$ , $g(x) = 2$ , $a = -1$ und $b = 1$             | e) $f(x) = x^2$ , $g(x) = x^3$ , $a = -2$ und $b = -1$                            |
| c) $f(x) = 3x$ , $g(x) = -x + 2$ , $a = 0$ und $b = 1$          | f) $f(t) = \sin t$ , $g(t) = \cos t$ , $a = -\frac{\pi}{4}$ , $b = \frac{\pi}{4}$ |

### Aufgabe 6: Flächen zwischen zwei Schaubildern

Berechnen Sie den Gesamtinhalt A der Flächen, die durch die Schaubilder der Funktionen f und g eingeschlossen werden.

- |                                    |                                |                              |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| a) $f(x) = x^2$ , $g(x) = 2 - x^2$ | b) $f(x) = x^3$ , $g(x) = x^2$ | c) $f(x) = x^3$ , $g(x) = x$ | d) $f(x) = x^3 - 3x$ , $g(x) = 2x^2$ |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|

### Aufgabe 7: Variable Grenzen

Geben Sie an, für welches t die Fläche A(t) genau 2 FE groß wird.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| a) $A(t) = \int_0^t (-x^2 + \frac{7}{3})dx$     | c) $A(t) = \int_1^t (x^2 - \frac{1}{3})dx$      | e) $A(t) = \int_1^2 (x^2 + t)dx$                 |
| b) $A(t) = \int_0^t (x^2 + \frac{4}{3}x + 1)dx$ | d) $A(t) = \int_2^t (x^2 - \frac{4}{3}x - 1)dx$ | f) $A(t) = \int_0^t (x^2 - \frac{2}{3}tx + 2)dx$ |

### Aufgabe 8: Substitutionsmethode

Berechnen Sie die folgenden Integrale mit Hilfe der Substitutionsmethode:

a) $\int_0^3 (2x \cdot e^{x^2-2}) dx$	f) $\int_0^9 \frac{1}{(x+1)^2} dx$	k) $\int_0^1 \left( x - \frac{2tx}{x^2+t} \right) dx$	p) $\int_0^1 x \cdot \ln(x^2+1) dx$
b) $\int_1^2 (4x \cdot e^{x^2-4}) dx$	g) $\int_0^1 \frac{4x-10}{(x^2-5x+6)^2} dx$	l) $\int_2^3 \frac{11x-4}{x-1} dx$	q) $\int_2^3 \frac{(\ln x)^2}{x} dx$
c) $\int_0^1 e^{3x+1} dx$	h) $\int_0^{0,5} \frac{2x}{x^4-2x^2+1} dx$	m) $\int_0^1 \frac{x^2+t}{x+t} dx$	r) $\int_1^2 \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx$
d) $\int_0^5 e^{-x} dx$	i) $\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$	n) $\int_{-1}^1 \frac{t^2-1}{t^2} x dt$	s) $\int_e^{2e} \frac{\ln x}{x} dx$
e) $\int_{-3}^0 e^{1-x} dx$	j) $\int_2^4 \frac{x}{x^2-1} dx$	o) $\int_1^2 \ln x dx$	t) $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x+1} dx$

### Aufgabe 9: Produktregel

Berechnen Sie die folgenden Integrale mit Hilfe der Produktregel:

a) $\int_0^2 (x \cdot e^x) dx$	c) $\int_{-1}^1 (x \cdot e^{2x}) dx$	e) $\int_0^1 (x^2 \cdot e^{-x}) dx$	g) $\int_1^3 (\ln x)^2 dx$
b) $\int_0^1 (x^2 \cdot e^x) dx$	d) $\int_1^2 (x \cdot e^{-x}) dx$	f) $\int_e^{e^2} x \cdot \ln x dx$	h) $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx$

### Aufgabe 10: Substitutions- und Produktregel mit beliebigen Grenzen

Zeigen Sie durch Integration von  $f(x)$  über ein beliebiges Intervall  $[a; b]$ , daß  $F(x)$  eine Stammfunktion von  $f(x)$  ist.

a) $f(x) = 4e^{2x}$ mit $F(x) = 2e^{2x}$	j) $f(x) = (x+3)e^{-x}$ mit $F(x) = -(x+4)e^{-x}$
b) $f(x) = e^{-0,5x-1}$ mit $F(x) = -2e^{-0,5x-1}$	k) $f(x) = (-3x+11)e^{3x}$ mit $F(x) = (-x+4)e^{3x}$
c) $f(x) = -6e^{-3x+1}$ mit $F(x) = 2e^{-3x+1}$	l) $f(x) = -(6x+1)e^{-3x+1}$ mit $F(x) = (2x+1)e^{-3x+1}$
d) $f(x) = 2x \cdot e^{0,5x^2}$ mit $F(x) = 2e^{0,5x^2}$	m) $f(x) = (2x-5)e^{2x+1}$ mit $F(x) = (x-3)e^{2x+1}$
e) $f(x) = -6x \cdot e^{x^2+1}$ mit $F(x) = -3e^{x^2+1}$	n) $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ mit $F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2+1)$
f) $f(x) = (4x-2)e^{-x^2+x-1}$ mit $F(x) = -2e^{-x^2+x-1}$	o) $f(x) = \frac{1}{(2x+4)^2}$ mit $F(x) = -\frac{1}{4x+8}$
g) $f(x) = (x+3)e^x$ mit $F(x) = (x+2)e^x$	p) $f(x) = 1 + \ln(x)$ mit $F(x) = x \cdot \ln(x)$
h) $f(x) = (-2x-1)e^x$ mit $F(x) = (-2x+1)e^x$	q) $f(x) = (\ln(x))^2$ mit $F(x) = x \cdot (\ln(x))^2 - 2x \cdot \ln(x) + 2x$
i) $f(x) = x^2 e^x$ mit $F(x) = (x^2 - 2x + 2)e^x$	r) $f(x) = 1 - (\ln(1-x))^2$ mit $F(x) = (1-x) \cdot (1 - \ln(1-x))^2$


### Aufgabe 11: Uneigentliche Integrale

Schreiben Sie die folgenden uneigentlichen Integrale als Grenzwert und berechnen sie ihn:

a) $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$	c) $\int_1^\infty \frac{1}{x^{1,5}} dx$	e) $\int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx$	g) $\int_0^\infty x \cdot e^{-x^2} dx$
b) $\int_0^\infty \frac{1}{(x+1)^2} dx$	d) $\int_0^1 \frac{1}{x^{0,5}} dx$	f) $\int_0^\infty e^{-x} dx$	h) $\int_0^1 \frac{1}{x^2} \cdot e^{-x} dx$

### Aufgabe 12: Uneigentliche Integrale

Geben Sie alle  $n > 0$  an, für die die Flächen A bzw. B zwischen der Hyperbel  $f(x) = x^{-n}$  und der y-Achse bzw. x-Achse endlich sind und berechnen Sie ihren Inhalt in Abhängigkeit von n.



## 5.5. Lösungen zu den Aufgaben zur Integralrechnung

### Aufgabe 1: Stammfunktionen ( $c \in \mathbb{R}$ )

- a)  $F_c(x) = c$       k)  $F_c(x) = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + c$   
 b)  $F_c(x) = x + c$       l)  $F_c(x) = \frac{5}{3} x^3 - \frac{3}{2} x^2 + 6x + c$   
 c)  $F_c(x) = 2x + c$       m)  $F_c(x) = \frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} x^2 + x + c$   
 d)  $F_c(x) = ax + c$       n)  $F_c(u) = u^4 - u^3 + \frac{7}{2} u^2 + c$   
 e)  $F_c(x) = \frac{1}{2} x^2 + c$       o)  $F_c(x) = \frac{1}{2} x^3 - \frac{3}{2} x^2 + \frac{2}{3} x^{1.5} - 5x + c$   
 f)  $F_c(x) = \frac{1}{3} x^3 + c$       p)  $F_c(x) = \frac{16}{5} x^5 + \frac{1}{2} x^2 - 7x + c - \frac{5}{x} + \frac{15}{x^2}$   
 g)  $F_c(x) = \frac{1}{4} x^4 + c$       q)  $F_c(t) = \frac{3}{4} t^2 - \sqrt{t} + c$   
 h)  $F_c(x) = -\frac{1}{2} x^{-2} + c$       r)  $F_c(x) = \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + \frac{a_{n-1}}{n} x^n + \dots + \frac{a_1}{2} x^2 + a_0 x + c$   
 i)  $F_c(x) = -x^{-1} + c$       s)  $F_c(t) = -\cos t + c$   
 j)  $F_c(x) = \ln x + c$       t)  $F_c(t) = \sin t + c$

### Aufgabe 2: Hauptsatz und Eigenschaften des Integrals

- a)  $\int_{-1}^1 (-\frac{1}{2} x^2 - x + \frac{3}{2}) dx = \left[ -\frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{2} x^2 + \frac{3}{2} x \right]_{-1}^1 = -\frac{1}{6} [x^3 + 3x^2 - 9x]_{-1}^1 = -(-\frac{5}{6}) - (-\frac{11}{6}) = \frac{8}{3}$  FE  
 b)  $\int_{-1}^2 (x^3 + x^2) dx = \left[ \frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{3} x^3 \right]_{-1}^2 = (4 + \frac{8}{3}) - (\frac{1}{4} - \frac{1}{3}) = 6 \frac{3}{4}$  FE  
 c)  $\int_{-3}^{-2} (x^2 + 3x + 2) dx = \left[ \frac{1}{3} x^3 + \frac{3}{2} x^2 + 2x \right]_{-3}^{-2} = \frac{1}{6} [2x^3 + 9x^2 + 12x]_{-3}^{-2} = \frac{5}{6}$  FE  
 d)  $\int_{-1}^2 x^2 dx = \frac{7}{3}$  FE,  $\int_{-2}^3 x^2 dx = \frac{19}{3}$  FE,  $\int_{-3}^4 x^2 dx = \frac{26}{3}$  FE,  
 e)  $\int_{-2}^1 x^2 dx = -\frac{7}{3}$  FE  
 f)  $A = \left| \int_0^1 (x^2 - 4x + 3) dx \right| + \left| \int_1^3 (x^2 - 4x + 3) dx \right| = \left| \frac{4}{3} \right| + \left| -\frac{4}{3} \right| = \frac{8}{3}$  FE

### Aufgabe 3: Flächen unterhalb der x-Achse

- a)  $A = \left| \int_{-1}^1 (x^2 - 1) dx \right| + \left| \int_1^2 (x^2 - 1) dx \right| = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$  FE  
 b)  $A = \left| \int_{-4}^{-3} (-x^2 - 4x - 3) dx \right| + \left| \int_{-3}^{-1} (-x^2 - 4x - 3) dx \right| = \left| -\frac{4}{3} \right| + \left| \frac{4}{3} \right| = \frac{8}{3}$  FE  
 c)  $A = \left| \int_{-1}^0 x^3 dx \right| + \left| \int_0^2 x^3 dx \right| = \frac{1}{4} + 4 = \frac{17}{4}$  FE  
 d)  $A = \left| \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx \right| + \left| \int_0^1 (x^3 - x) dx \right| = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$  FE

$$e) A = \left| \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx \right| + \left| \int_0^1 (x^3 - x) dx \right| + \left| \int_1^2 (x^3 - x) dx \right| = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{9}{4} = \frac{11}{3} \text{ FE}$$

$$f) A = 2 \left| \int_0^{\pi} (\sin t) dt \right| = 4 \text{ FE}$$

**Aufgabe 4: Flächen unterhalb der x-Achse**

$$a) A = 2 \cdot \int_0^1 (-x^2 + 1) dx = 2 \cdot \left[ -\frac{1}{3} x^3 + x \right]_0^1 = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \text{ FE}$$

$$b) A = 2 \cdot \left| \int_0^2 (x^3 - 4x) dx \right| = 2 \cdot \left| \left[ \frac{1}{4} x^4 - 2x^2 \right]_0^2 \right|^2 = 2 \cdot |-4| = 8 \text{ FE}$$

$$c) A = 2 \cdot \int_0^1 (-x^4 + x^2) dx = 2 \cdot \left[ -\frac{1}{5} x^5 + \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = 2 \cdot \frac{2}{15} = \frac{4}{15} \text{ FE}$$

$$d) A = \int_0^1 (x^3 - 3x^2 + 2x) dx + \left| \int_1^2 (x^3 - 3x^2 + 2x) dx \right| = \left[ \frac{1}{4} x^4 - x^3 + x^2 \right]_0^1 + \left[ \frac{1}{4} x^4 - x^3 + x^2 \right]_1^2 = \frac{1}{4} + \left| -\frac{1}{4} \right| = \frac{1}{2} \text{ FE}$$

**Aufgabe 5: Flächen zwischen zwei Schaubildern**

$$a) A = \int_{-1}^1 1 dx = 2 \text{ FE}$$

$$b) A = \left| \int_{-1}^1 (x^2 - 2) dx \right| = 3 \frac{1}{3} \text{ FE}$$

$$c) A = \left| \int_0^{0,5} (4x - 2) dx \right| + \left| \int_{0,5}^1 (4x - 2) dx \right| = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \text{ FE}$$

$$d) A = \left| \int_0^1 (x^2 - x) dx \right| + \left| \int_1^2 (x^2 - x) dx \right| = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 1 \text{ FE}$$

$$e) A = \left| \int_{-2}^{-1} (x^3 - x^2) dx \right| = 6 \frac{1}{12} \text{ FE}$$

$$f) A = \left| \int_{-0,75\pi}^{0,25\pi} (\cos t - \sin t) dt \right| = 2\sqrt{2} \text{ FE}$$

**Aufgabe 6: Flächen zwischen zwei Schaubildern**

$$a) A = \left| \int_{-1}^1 (2x^2 - 2) dx \right| = \frac{8}{3}$$

$$b) A = \left| \int_0^1 (x^3 - x^2) dx \right| = \frac{1}{12}$$

$$c) A = \left| \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx \right| + \left| \int_0^1 (x^3 - x) dx \right| = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$d) A = \left| \int_{-1}^0 (x^3 - 2x^2 - 3x) dx \right| + \left| \int_0^3 (x^3 - 2x^2 - 3x) dx \right| = \frac{7}{12} + \frac{45}{4} = \frac{71}{6}$$

### Aufgabe 7: Variable Grenzen

a)  $A(t) = \int_0^t (-x^2 + \frac{7}{3})dx = -\frac{1}{3}t^3 + \frac{7}{3}t = 2 \Leftrightarrow t^3 - 7t + 6 = 0 \Leftrightarrow t = 1$

b)  $A(t) = \int_0^t (x^2 + \frac{4}{3}x + 1)dx = \frac{1}{3}t^3 + \frac{2}{3}t^2 + t = 2 \Leftrightarrow t^3 + 2t^2 + 3t - 6 = 0 \Rightarrow t = 2$

c)  $A(t) = \int_1^t (x^2 - \frac{1}{3})dx = \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{3}t - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 2 \Leftrightarrow t^3 - t - 6 = 0 \Rightarrow t = 2$

d)  $A(t) = \int_2^t (x^2 - \frac{4}{3}x - 1)dx = \frac{1}{3}t^3 - \frac{2}{3}t^2 - t - \frac{8}{3} + 2 = 2 \Leftrightarrow t^3 - 2t^2 - 3t = 0 \Rightarrow t = 3$

e)  $A(t) = \int_1^2 (x^2 + t)dx = \frac{1}{3}2^3 + 2t - \frac{1}{3}1^3 - 1t = \frac{7}{3} + t = 2 \Leftrightarrow 14 + 6t = 12 \Rightarrow t = -\frac{1}{3}$

f)  $A(t) = \int_0^t (x^2 - \frac{2}{3}tx + 2)dx = \frac{1}{3}t^3 - \frac{t}{3}t^2 + 2t = 2 \Leftrightarrow 2t = 2 \Rightarrow t = 1$

### Aufgabe 8: Substitutionsmethode

a)  $\int_0^3 (2x \cdot e^{x^2-2})dx = \int_{-2}^7 e^z dz = e^7 - e^{-2} \approx 1096,50 \text{ mit } z(x) = x^2 - 2$

b)  $\int_1^2 (4x \cdot e^{x^2-4})dx = 2 \int_1^2 2x \cdot e^{x^2-4} dx = 2 \int_{-3}^0 e^z dz = 2(1 - e^{-3}) \approx 1,90 \text{ mit } z(x) = x^2 - 4$

c)  $\int_0^1 e^{3x+1} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 3 \cdot e^{3x+1} dx = \frac{1}{3} \int_1^4 e^z dz = \frac{1}{3}(e^4 - e) \approx 17,29 \text{ mit } z(x) = 3x + 1$

d)  $\int_0^5 e^{-x} dx = - \int_0^5 (-1) \cdot e^{-x} dx = - \int_0^{-5} e^z dz = -(e^{-5} - 1) \approx 0,99 \text{ mit } z(x) = -x$

e)  $\int_{-3}^0 e^{1-x} dx = - \int_{-3}^0 (-1) \cdot e^{1-x} dx = - \int_{-3}^1 e^z dz = -(e - e^4) \approx 51,88 \text{ mit } z(x) = 1 - x$

f)  $\int_0^9 \frac{1}{(x+1)^2} dx = \int_1^{10} \frac{1}{z^2} dz = \left[ -\frac{1}{z} \right]_1^{10} = 0,9 \text{ mit } z(x) = x + 1$

g)  $\int_0^1 \frac{4x-10}{(x^2-5x+6)^2} dx = \left[ -\frac{2}{x^2-5x+6} \right]_0^1 = -\frac{2}{3}$

h)  $\int_0^{0,5} \frac{2x}{x^4-2x^2+1} dx = \int_0^{0,5} \frac{2x}{(x^2-1)^2} dx = \left[ -\frac{1}{x^2-1} \right]_0^{0,5} = \frac{1}{3}$

i)  $\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = \ln 2$

j)  $\int_2^4 \frac{x}{x^2-1} dx = \left[ \frac{1}{2} \ln(x^2-1) \right]_2^4 = \frac{1}{2} \ln 5$

k)  $\int_0^1 \left( x - \frac{2tx}{x^2+t} \right) dx = \int_0^1 x dx - \int_t^{1+t} \frac{t}{z} dz = \left[ \frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 - t \ln z \Big|_t^{1+t} = \frac{1}{2} - t(\ln(1+t) - \ln t) \text{ mit } z(x) = x^2 + t$

l)  $\int_2^3 \frac{11x-4}{x-1} dx = \int_1^2 \frac{11z+7}{z} dz = \int_1^2 \left( 11 + \frac{7}{z} \right) dz = 11z + 7 \ln(z) \Big|_1^2 = 11 + 7 \ln(2) \approx 15,85 \text{ mit } z(x) = x - 1$

m)  $\int_0^1 \frac{x^2+t}{x+t} dx = \int_t^{1+t} \frac{z^2-2tz+t^2+t}{z} dz = \int_t^{1+t} \left( z - 2t + \frac{t^2+t}{z} \right) dz = \left[ \frac{1}{2} z^2 - 2tz + (t^2+t) \ln(z) \right]_t^{1+t} = \frac{1}{2} - t + (t^2+t) \ln \left( 1 - \frac{1}{t} \right)$

- n)  $\int_{-1}^1 \frac{t^2 - 1}{t^2} x \, dx = \frac{t^2 - 1}{t^2} \int_{-1}^1 x \, dx = \frac{t^2 - 1}{t^2} \left[ \frac{1}{2} x^2 \right]_{-1}^1 = 0$
- o)  $\int_1^2 \ln(x) \, dx = x \cdot \ln(x) - x \Big|_1^2 = (2 \cdot \ln(2) - 2) - (0 - 1) \approx 0,39$  mit Stammfunktion aus Formelsammlung
- p)  $\int_0^1 x \cdot \ln(x^2 + 1) \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 2x \cdot \ln(x^2 + 1) \, dx = \int_1^2 \ln(z) \, dz = \frac{1}{2} \ln(2) - \frac{1}{2} \approx 0,19$  mit  $z(x) = x^2 + 1$
- q)  $\int_2^3 \frac{(\ln x)^2}{x} \, dx = \int_{\ln 2}^{\ln 3} z^2 \, dz = \frac{1}{3} (\ln(3))^3 - \frac{1}{3} (\ln(2))^3 \approx 0,33$  mit  $z(x) = \ln(x)$
- r)  $\int_1^2 \frac{\sqrt{\ln x}}{x} \, dx = \int_{\ln 1}^{\ln 2} \sqrt{z} \, dz = \left[ \frac{2}{3} z^{1.5} \right]_0^{\ln 2} = \frac{2}{3} (\ln(2))^{1.5} \approx 0,38$  mit  $z(x) = \ln(x)$
- s)  $\int_e^{2e} \frac{\ln x}{x} \, dx = \int_{\ln e}^{\ln 2e} z \, dz = \frac{1}{2} (\ln(2e))^2 - \frac{1}{2} \approx 0,93$  mit  $z(x) = \ln(x)$
- t)  $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x+1} \, dx = \int_{\ln(1)}^{\ln(2)} z \cdot dz = \frac{1}{2} (\ln(2))^2 \approx 0,24$  mit  $z(x) = \ln(x+1)$

### Aufgabe 9: Produktregel

- a)  $\int_0^2 (x \cdot e^x) \, dx = \left[ x \cdot e^x \right]_0^2 - \int_0^2 (1 \cdot e^x) \, dx = \left[ x \cdot e^x \right]_0^2 - \left[ e^x \right]_0^2 = \left[ (x-1) \cdot e^x \right]_0^2 = e^2 + 1 \approx 8,39$
- b)  $\int_0^1 (x^2 \cdot e^x) \, dx = \left[ x^2 \cdot e^x \right]_0^1 - \int_0^1 (2x \cdot e^x) \, dx = \left[ x^2 \cdot e^x \right]_0^1 - 2 \left[ (x-1) \cdot e^x \right]_0^1 = \left[ (x^2 - 2x + 2) \cdot e^x \right]_0^1 = e - 2 \approx 0,72$   
(Ergebnis aus a) einsetzen!)
- c)  $\int_{-1}^1 (x \cdot e^{2x}) \, dx = \left[ x \cdot \frac{1}{2} e^{2x} \right]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 (1 \cdot \frac{1}{2} e^{2x}) \, dx = \left[ x \cdot \frac{1}{2} e^{2x} \right]_{-1}^1 - \left[ \frac{1}{4} e^{2x} \right]_{-1}^1 = \left[ \left( \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \right) \cdot e^{2x} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{4} e^2 + \frac{3}{4} e^{-2} \approx 1,90$
- d)  $\int_1^2 (x \cdot e^{-x}) \, dx = \left[ x \cdot (-e^{-x}) \right]_1^2 - \int_1^2 (1 \cdot (-e^{-x})) \, dx = \left[ -x \cdot e^{-x} \right]_1^2 - \left[ e^{-x} \right]_1^2 = \left[ (-x-1) \cdot e^{-x} \right]_1^2 = -3e^{-2} + 2e^{-1} \approx 0,33$
- e)  $\int_0^1 (x^2 \cdot e^{-x}) \, dx = \left[ x^2 \cdot (-e^{-x}) \right]_0^1 - \int_0^1 (2x \cdot (-e^{-x})) \, dx = \left[ -x^2 \cdot e^{-x} \right]_0^1 + 2 \int_0^1 (x \cdot e^{-x}) \, dx = \left[ -x^2 \cdot e^{-x} \right]_0^1 + 2 \left[ (-x-1) \cdot e^{-x} \right]_0^1 = \left[ (-x^2 - 2x - 2) \cdot e^{-x} \right]_0^1 = -5 \cdot e^{-1} + 2 \approx 0,16$  (Ergebnis aus d) einsetzen!)
- f)  $\int_e^{e^2} x \cdot \ln(x) \, dx = \left[ \frac{1}{2} x^2 \cdot \ln(x) \right]_e^{e^2} - \int_e^{e^2} \frac{1}{2} x^2 \cdot \frac{1}{x} \, dx = \left[ \frac{1}{2} x^2 \cdot \ln(x) \right]_e^{e^2} - \left[ \frac{1}{4} x^2 \right]_e^{e^2} = \left[ \frac{1}{4} x^2 (2 \ln(x) - 1) \right]_e^{e^2} = \frac{1}{4} e^2 (3e^2 - 1) \approx 39,10$
- g)  $\int_1^3 (\ln(x))^2 \, dx = (x \ln(x) - x) \cdot \ln(x) \Big|_1^3 - \int_1^3 (x \cdot \ln(x) - x) \cdot \frac{1}{x} \, dx = \left[ x(\ln(x))^2 - x \ln(x) \right]_1^3 - \int_1^3 (\ln(x) - 1) \, dx = \left[ x(\ln(x))^2 - x \ln(x) \right]_1^3 - \left[ x \ln(x) - x \right]_1^3 = \left[ x(\ln(x))^2 - 2x \ln(x) + 2x \right]_1^3 = 3 \cdot (\ln(3))^2 - 6 \cdot \ln(3) + 6 - 2 \approx 1,03$
- h)  $\int_1^2 \frac{\ln(x)}{x} \, dx = \int_1^2 \frac{1}{x} \cdot \ln(x) \, dx = \ln(x) \cdot \ln(x) \Big|_1^2 - \int_1^2 \ln(x) \cdot \frac{1}{x} \, dx \Rightarrow \int_1^2 \frac{\ln(x)}{x} \, dx = \frac{1}{2} \ln(x) \cdot \ln(x) \Big|_1^2 = \frac{(\ln(2))^2}{2} \approx 0,24.$

### Aufgabe 10: Substitutions- und Produktregel mit beliebigen Grenzen

- a)  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b 2 \cdot 2e^{2x}dx = \int_{2a}^{2b} 2e^z dz = [2e^z]_{2a}^{2b} = [2 \cdot e^{2x}]_a^b = F(x)_a^b$
- b)  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \left(\frac{1}{-0,5}\right) \cdot (-0,5)e^{-0,5x-1}dx = \int_{-0,5a-1}^{-0,5b-1} -2e^z dz = [-2e^z]_{-0,5a-1}^{-0,5b-1} = [-2e^{-0,5x-1}]_a^b = F(x)_a^b$
- c)  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b (-6) \cdot e^{-3x+1}dx = \int_a^b 2 \cdot (-3)e^{-3x+1}dx = \int_{-3a+1}^{-3b+1} 2e^z dz = [2e^z]_{-3a+1}^{-3b+1} = [2 \cdot e^{-3x+1}]_a^b = F(x)_a^b$
- d)  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b 2 \cdot xe^{0,5x^2} dx = \int_{0,5a^2}^{0,5b^2} 2e^z dz = [2 \cdot e^z]_{0,5a^2}^{0,5b^2} = [2 \cdot e^{0,5x^2}]_a^b = F(x)_a^b$
- e)  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b (-3) \cdot 2xe^{x^2+1}dx = \int_{a^2+1}^{b^2+1} -3e^z dz = [-3e^z]_{a^2+1}^{b^2+1} = [-3 \cdot e^{x^2+1}]_a^b = F(x)_a^b$
- f)  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b (-2) \cdot (-2x+1)e^{-x^2+x-1}dx = \int_{-a^2+a-1}^{-b^2+b-1} -2e^z dz = [-2e^z]_{-a^2+b-1}^{-b^2+b-1} = [-2 \cdot e^{-x^2+x-1}]_a^b = F(x)_a^b$
- g)  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b (3x^2 - 2x - 2)e^{x^3-x^2-2x+1}dx = \int_{a^3-a^2-2a+1}^{b^3-b^2-2b+1} e^z dz = [e^z]_{a^3-a^2-2b+1}^{b^3-b^2-2b+1} = [e^{x^3-x^2-2x+1}]_a^b = F(x)_a^b$
- h)  $\int_a^b f(x)dx = [(x+3) \cdot e^x]_a^b - \int_a^b 1 \cdot e^x dx = [(x+3) \cdot e^x]_a^b - [e^x]_a^b = [(x+3)e^x - 1e^x]_a^b = [(x+2) \cdot e^x]_a^b = F(x)_a^b$
- i)  $\int_a^b f(x)dx = [(-2x-1) \cdot e^x]_a^b - \int_a^b (-2) \cdot e^x dx = [(-2x-1) \cdot e^x]_a^b - [(-2)e^x]_a^b = [(-2x-1)e^x - (-2)e^x]_a^b = [(-2x+1) \cdot e^x]_a^b = F(x)_a^b$
- j)  $\int_a^b f(x)dx = [x^2 \cdot e^x]_a^b - \int_a^b 2x \cdot e^x dx = [x^2 \cdot e^x]_a^b - \left[ [2xe^x]_a^b - \int_a^b 2e^x dx \right] = [x^2 \cdot e^x]_a^b - \left[ [2xe^x]_a^b - [2e^x]_a^b \right] = [x^2e^x - 2xe^x + 2e^x]_a^b = [(x^2 - 2x + 2) \cdot e^x]_a^b = F(x)_a^b$
- k)  $\int_a^b f(x)dx = [(x+3) \cdot (-e^{-x})]_a^b - \int_a^b 1 \cdot (-e^{-x}) dx = [(-x-3) \cdot e^{-x}]_a^b - [e^{-x}]_a^b = [(-x-3)e^{-x} - 1e^{-x}]_a^b = [(-x-4)e^{-x}]_a^b = F(x)_a^b$
- l)  $\int_a^b f(x)dx = \left[ (-3x+11) \cdot \left( \frac{1}{3} e^{3x} \right) \right]_a^b - \int_a^b (-3) \cdot \frac{1}{3} e^{3x} dx = \left[ (-x+\frac{11}{3}) \cdot e^{3x} \right]_a^b - \left[ -\frac{1}{3} e^{3x} \right]_a^b = \left[ (-x+\frac{11}{3})e^{3x} + \frac{1}{3} e^{3x} \right]_a^b = [(-x+4)e^{3x}]_a^b = F(x)_a^b$
- m)  $\int_a^b f(x)dx = \left[ (-6x-1) \cdot \left( -\frac{1}{3} e^{-3x+1} \right) \right]_a^b - \int_a^b (-6) \cdot \left( -\frac{1}{3} e^{-3x+1} \right) dx = \left[ (2x+\frac{1}{3}) \cdot e^{-3x+1} \right]_a^b - \left[ -\frac{2}{3} e^{-3x+1} \right]_a^b = \left[ (2x+\frac{1}{3})e^{-3x+1} + \frac{2}{3} e^{-3x+1} \right]_a^b = [(2x+1)e^{-3x+1}]_a^b = F(x)_a^b$
- n)  $\int_a^b f(x)dx = \left[ (2x-5) \cdot \frac{1}{2} e^{2x+1} \right]_a^b - \int_a^b 2 \cdot \frac{1}{2} e^{2x+1} dx = \left[ (x-\frac{5}{2}) \cdot e^{2x+1} \right]_a^b - \left[ \frac{1}{2} e^{2x+1} \right]_a^b = \left[ (x-\frac{5}{2})e^{2x+1} - \frac{1}{2} e^{2x+1} \right]_a^b = [(x-3)e^{2x+1}]_a^b = F(x)_a^b$
- o)  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{1}{2} \cdot 2x \cdot \frac{1}{x^2+1} dx = \int_{a^2+1}^{b^2+1} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z} dz = \left[ \frac{1}{2} \ln(z) \right]_{a^2+1}^{b^2+1} = \left[ \frac{1}{2} \ln(x^2+1) \right]_a^b = F(x)_a^b$

p)  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{1}{(2x+4)^2} dx = \int_{(2a+4)^2}^{(2b+4)^2} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{z^2} dz = \left[ -\frac{1}{2z} \right]_{(2a+4)^2}^{(2b+4)^2} = \left[ -\frac{1}{2(2x+4)} \right]_a^b = F(x) \Big|_a^b$

q)  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b (1 + \ln(x)) dx = x + x \cdot \ln(x) - x \Big|_a^b = F(x) \Big|_a^b$  (mit Stammfunktion des  $\ln$  aus Formelsammlung)

r)  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \ln(x) \cdot \ln(x) dx = \left[ (x \ln(x) - x) \ln(x) \right]_a^b - \int_a^b (x \ln(x) - x) \cdot \frac{1}{x} dx = \left[ x(\ln(x))^2 - x \ln(x) \right]_a^b - \int_a^b (\ln(x) - 1) dx$   
 $= \left[ x(\ln(x))^2 - x \ln(x) \right]_a^b - x \ln(x) - x \Big|_a^b = \left[ x(\ln(x))^2 - 2x \ln(x) + 2x \right]_a^b = F(x) \Big|_a^b$

s)  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b 1 - (\ln(1-x))^2 dx = x \Big|_a^b - \int_a^b (\ln(1-x))^2 dx$   
 $= x \Big|_a^b + \left[ (1-x)(\ln(1-x))^2 - 2(1-x) \ln(1-x) + 2(1-x) \right]_a^b = \left[ (1-x)(\ln(1-x))^2 - 2(1-x) \ln(1-x) + (1-x) + 1 \right]_a^b$   
 $= \left[ (1-x)((\ln(1-x))^2 - 2 \ln(1-x) + 1) + 1 \right]_a^b = \left[ (1-x)(\ln(1-x) - 1)^2 + 1 \right]_a^b = \left[ (1-x)(1 - \ln(1-x))^2 \right]_a^b = F(x) \Big|_a^b$   
 (Die 1 fällt bei der Differenzbildung weg!)

NR:  $-\int_a^b (\ln(1-x))^2 dx = \int_{1-a}^{1-b} \ln z \cdot \ln z dz = (z \ln z - z) \ln z \Big|_{1-a}^{1-b} - \int_{1-a}^{1-b} (z \ln z - z) \cdot \frac{1}{z} dz$   
 $= \left[ z(\ln z)^2 - z \ln z \right]_{1-a}^{1-b} - \int_{1-a}^{1-b} (\ln z - 1) dz = \left[ z(\ln z)^2 - z \ln z \right]_{1-a}^{1-b} - z \ln z - z \Big|_{1-a}^{1-b} = \left[ z(\ln z)^2 - 2z \ln z + 2z \right]_{1-a}^{1-b}$   
 $= \left[ (1-x)(\ln(1-x))^2 - 2(1-x) \ln(1-x) + 2(1-x) \right]_a^b$  mit  $z(x) = 1-x$

### Aufgabe 11: Uneigentliche Integrale

a)  $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = 1$       c)  $\int_1^\infty \frac{1}{x^{1,5}} dx = 2$       e)  $\int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx = 2$       g)  $\int_0^\infty x \cdot e^{-x^2} dx = \frac{1}{2}$

b)  $\int_0^\infty \frac{1}{(x+1)^2} dx = 1$       d)  $\int_0^\infty \frac{1}{x^{0,5}} dx = 2$       f)  $\int_0^\infty e^{-x} dx = 1$       h)  $\int_0^1 \frac{1}{x^2} \cdot e^{-\frac{1}{x}} dx = \frac{1}{e}$

### Aufgabe 12: Uneigentliche Integrale

Für  $n < 1$  ist  $A = \int_0^1 \frac{1}{x^n} dx = \left[ \frac{1}{1-n} x^{1-n} \right]_0^1 = \frac{1}{1-n}$  und

für  $n > 1$  ist  $A = \int_1^\infty \frac{1}{x^n} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{1-n} x^{1-n} \right]_0^b = \frac{1}{n-1}$ .